

安徽省铜陵福成农药有限公司

一、公司风采

安徽省铜陵福成农药有限公司是一个集研发、生产和销售为一体，以农药剂型业务为核心的国家定点农药制剂企业。公司坐落于铜陵市经开区。公司成立于 2002 年元月 9 日，目前，生产检测系统完善，先后开发剂型有乳油、水剂、水乳剂、可湿性粉剂和悬浮剂及水分散粒剂等，产品包括杀虫剂、杀菌剂和除草剂等各类农药及有机肥水溶肥料。公司建立起了比较完整的销售网络系统，现在正向纵深推进，不断细化市场操作，大胆创新，将深度分销工作和样板市场打造深入推进。

公司在成长过程中，沉积了独特的福成企业文化，实现了企业管理的信息化，公司今后的发展中将以科技创新和品牌化为中心，以资本化为依托，快速推动企业又快又好发展。

“诚信、合作、共赢、发展”是本公司经营宗旨，发展壮大的福成竭诚欢迎广大客商携手共创美好未来。

二、产品简介

（一）6%双氟·唑草酮可分撒油悬浮剂（冬好）

产品特点：本品是双氟磺草胺和唑草酮的复配而成的除草剂，二者复配可以相互补充，显著提高除草效果。使用本品后，阔叶杂草即停止生长并于 1-2 周后死亡。

防治对象：冬小麦田一年生阔叶杂草



冬好®

农药登记证号: PD20183415
生产许可证号: 农药生许(皖)0031
产品标准号: Q/FC022-2018

双氟·唑草酮

总有效成分含量: 6%
有效成分及其含量:
双氟磺草胺2% 唑草酮4%
剂型: 可分散油悬浮剂

净含量: 25克

安徽省铜陵福成农药有限公司
地址: 安徽省铜陵市钟鸣镇丰泉东路 邮编: 244121
电话: 0562-2106806 传真: 0562-2106816

产品性能:
本品是双氟磺草胺和唑草酮的复配而成的除草剂,二者复配可以相互补充,显著提高除草效果。使用本品后,阔叶杂草即停止生长并于1-2周后死亡。

使用范围和使用方法:

作物/场所	防治对象	用药量(制剂量/亩)	施用方式
冬小麦田	一年生阔叶杂草	15-20毫升/亩	茎叶喷雾

使用技术要求:

1. 冬小麦4叶后至拔节前,田间阔叶杂草2-5叶期施药,均匀茎叶喷雾。
2. 大风天或预计24小时内低温或有雨,请勿施药。
3. 在温度10℃以上使用,温度过低可能会对小麦生长带来影响。
4. 每个作物周期最多使用1次。

注意事项:

1. 因本品对阔叶作物很敏感,施药时避免药液漂移到周围的阔叶作物上。
2. 使用本品时应穿防护服和戴手套,避免吸入药液;施药期间不可吃东西和饮水;施药后应及时洗手、洗脸等。
3. 本品对藻类高毒,施药时应注意对该类生物的影响。
4. 孕妇及哺乳期的妇女禁止接触本品。
5. 用过的容器应妥善处理,不可做他用,也不可随意丢弃。
6. 禁止在河塘等水域清洗施药器具。水产养殖区、河塘等水体附近禁用。

中毒急救措施:
使用中或使用后若感觉不适;应立即停止工作,采取急救措施。皮肤接触时,用大量清水冲洗干净;若不慎溅入眼睛中,提起眼睑立即用清水清洗至少15分钟,仍有不适时,就医;如误服,立即携此标签送医院对症治疗,无特效解毒剂。

储存和运输方法:

1. 本品应贮存在干燥、阴凉、通风、防雨处,远离火源或热源。
2. 置于儿童、无关人员触及不到之处,并加锁。勿与食品、饮料、饲料等其他商品同贮同运。

质量保证期: 2年
生产日期及批号: 见喷码

(二) 10%氟氟草酯可分撒油悬浮剂(凌巧)

产品特点: 本品是芳氧苯氧丙酸类除草剂中唯一对水稻具有高度安全性的品种,和该类其他品种一样,也是内吸传导性除草剂。由植物体的叶片和叶鞘吸收,韧皮部传导,积累于植物体的分生组织区,抵制乙酰辅酶A羧化酶,使脂肪酸合成停止,细胞的生长分裂不能正常进行,膜系统等含脂

防治对象：水稻田(直播) 一年生禾本科杂草



产品性能(用途):

本品是芳氧苯胺类除草剂中唯一对水稻具有高度安全性的品种, 和该类其他品种一样, 也是内吸传导性除草剂。由根吸收的叶片和叶鞘吸收, 输布到茎秆, 积累于维管束的分生组织区, 抵制了维管束核酸合成, 阻碍细胞合成停止, 细胞的分生分裂不能正常进行, 根系停止含氮物质的输入, 最后导致植物死亡。从氟氯草酯吸收起至杂草死亡比较缓慢, 一般需要1-3周。对水稻直播田一年生禾本科杂草有较好的防效。

使用技术和使用方法:

作物	防治对象	制剂量药量	使用方法
水稻(直播)	一年生禾本科杂草	900-1200 克/公顷	茎叶喷雾

1. 直播水稻田于千金子等禾本科杂草20-30%茎叶吐穗前, 按使用剂量使用, 施药前灌水, 使亩水2/3以上露出水面。施药24小时深水5-5厘米, 保水5-7天。
2. 大风或连续4小时以上降雨, 请勿喷药。
3. 每季最多使用1次。

储存和运输:

本品应当置于儿童、无关人员及动物接触不到的地方, 并加锁。贮存于避光、干燥、阴凉、通风、防雨处, 远离火源或热源。运输时应注意避光、防潮湿、雨淋。勿与食品、饮料、饲料、种子等其他商品混装同运。

注意事项:

1. 勿与其它强酸或强碱性物质混用, 以免影响效果。
2. 本品对鸟类等水生生物及天敌赤眼蜂有毒, 因此, 远离水产养殖区施药, 禁止在河塘等水体中清洗施药器具, 施药后的污水不得直接排入水体; 周围富营养化作物需禁用; 养鱼稻田、水产养殖区附近禁用。
3. 配药及施药时, 应穿防护服、靴子, 戴防护镜、胶皮手套和口罩, 避免吸入药雾。施药期间不可吃东西、饮水、吸烟等。施药后, 彻底清洗防护用品, 洗澡, 并更换和清洗工作服。
4. 避免孕妇及哺乳期妇女避免接触本品, 该产品属易燃液体, 注意贮存和使用安全。
5. 用过的容器应妥善保管, 不可做他用, 也可随意丢弃。

中毒急救:

中毒症状: 对眼睛、皮肤和粘膜有刺激作用。
急救措施: 使用中或使用后如果感觉不适, 应立即停止工作, 采取急救措施, 并使用标签送医院就诊。1. 皮肤接触: 脱去污染的衣物, 用肥皂去除沾染农药, 立即用大量清水和肥皂冲洗; 2. 眼睛吸入: 立即用流动清水冲洗不少于15分钟; 3. 吸入: 立即离开施药现场, 转移到空气清新处; 4. 误食: 立即停止服用, 用清水充分漱口后, 立即携带农药标签到医院就诊。

生产日期及保质期: 见瓶底

质量保证期: 2年

除 草 剂

(三) 25 克/升五氟磺草胺可分散油悬浮剂 (凌中致)

产品特点：本品为磺酰胺类除草剂，茎叶喷雾处理可以防除水稻田中的一年生杂草。

防治对象：水稻移栽田一年生杂草



凌中致®

农药登记证号: PD20181889
农药生产许可证号: 农药生许(皖)0031
产品标准号: Q/FC021-2018

五氟磺草胺

有效成分及其含量:
五氟磺草胺25克/升
剂型: 可分散油悬浮剂

低毒

净含量: 100毫升

安徽省铜陵福成农药有限公司
地址: 安徽省铜陵市铜官山区丰源路 邮编: 244121
电话: 0562-2106806 传真: 0562-2106816

产品性能:
本品为磺酰胺类除草剂, 茎叶喷雾处理可以防除水稻田中的一年生杂草。

使用范围和使用方法:

作物/场所	防治对象	用药量(制剂量/亩)	施用方式
水稻移栽田	一年生杂草	60-80毫升/亩	茎叶喷雾

使用技术要求:

1. 本品在水稻田应于稗草2-3叶期施药。2. 茎叶喷雾时, 用水量30-40升/亩, 施药前排水, 使杂草茎叶2/3以上露出水面, 施药后24小时至72小时内灌水, 保持3-5厘米水层5-7天。3. 施药量按稗草密度和叶龄确定, 稗草密度大、草龄大, 使用上限用药量。4. 每季最多使用1次。5 注意水层勿淹没水稻心叶, 避免产生药害。

储存和运输方法:

1. 本品应密封贮存在干燥、阴凉、通风、防雨处, 远离火源或热源。2. 存放于儿童触及不到之处, 并加锁。3. 勿与食品、饮料、粮食、饲料等其他商品同贮同运。贮存或运输时堆层不得超过规定, 注意轻拿轻放, 以免损坏包装, 导致产品泄漏。

注意事项:

1. 使用本品时应穿长衣长裤、靴子、戴手套、眼镜、口罩防护用品(见图形标识), 避免吸入药液。施药期间不可吃东、西或饮水等。施药后应及时洗手和洗脸等。2 本品对水生生物有毒, 应远离水产养殖区、鱼塘等水体施药, 禁止在鱼塘等水体中清洗施药器具。鱼或蟹套养稻田, 施药后的田水不得直接排入水体。3 清洗喷药器械或废弃药液时, 切忌污染水源。用过的容器应妥善处理, 不可做他用, 也不可随意丢弃。4. 避免孕妇及哺乳期妇女接触。

中毒急救措施:

1. 中毒症状: 动物实验表明可能造成眼或皮肤刺激。2. 眼睛溅入: 立刻用大量清水冲洗至少15分钟, 如配戴隐形眼镜, 冲洗1分钟后摘掉眼镜再冲洗几分钟。如症状持续, 携此标签去医院诊治。3. 误食: 不要自行引吐, 携此标签送医诊治。4. 皮肤沾附: 脱去被溅到衣服。立即用大量清水冲洗皮肤。衣服彻底清洗后方可再穿。5. 给医护人员提示: 可用乙醇和血透析方法治疗。

质量保证期: 2年 生产日期及批号: 见瓶盖

除 草 剂

三、企业市场联系人及电话

联系人: 吴成斌

联系电话: 0562-2106806 18856206660