

福建凯立生物制品有限公司

一、企业风采

福建凯立生物制品有限公司坐落于福建省漳州市长泰区，是专业从事农药原药与制剂的研发、生产、销售与应用的定点高新技术企业。

公司专注生物农药、立足抑杀菌农药市场、专工中生菌素产品，拥有中生菌素母药发明专利（ZL200310103250.X）中生菌素是国家科技成果重点推广项目（98110203A），该项目于2006年获国家科技进步二等奖。

中生菌素母药及系列产品已荣获中国绿色食品协会“绿色食品生产资料”认证，发展应用前景广阔，具有良好的防治效果，得到了市场的积极反响和好评，在农作物病害的控制及绿色食品的生产中被广泛应用，适用于飞防等特殊施药方式。

二、企业市场联系人及电话

联系人：张美爱

联系电话：0596-6950678

三、产品简介

产品介绍：金无细



农药登记证号：PD20181786

登记证持有人：福建凯立生物制品有限公司

农药名称：中生菌素

剂型：可湿性粉剂

毒性及其标识：微毒

有效成分及其含量：中生菌素 12%

使用范围和使用方法：

作物/场所	防治对象	用药量（制剂量/亩）	施用方式
三七	细菌性根腐病	40-50 克/亩	灌根
库尔勒香梨树	火疫病	2000-2500 倍液	喷雾
柑橘树	溃疡病	3500-4000 倍液	喷雾
猕猴桃	溃疡病	2400-3200 倍液	喷雾
黄瓜	细菌性角斑病	25-30 克/亩	喷雾

使用技术要求：

1. 黄瓜细菌性角斑病：于病害发病初期喷雾施药，每季最多使用 3 次，间隔 7—10 天 1 次，用水量 45—60 公斤/亩；库尔勒香梨树火疫病：病害发病初期，喷雾施药 2 次，间隔 10 天左右施药 1 次；柑橘树溃疡病：于发病前或发病初期，可施药 3 次，间隔 7—10 天施药 1 次；三七细菌性根腐病，于发病前或发病初期，可灌根施药 3 次，间隔 7—10 天施药 1 次，用水量 200 公斤/亩。2. 大风天或预计 1 小时内降雨，请勿施药。

产品介绍： 骁延



农药登记证号：PD20211959

登记证持有人：福建凯立生物制品有限公司

农药名称： 中生菌素

剂型： 可溶液剂

毒性及其标识： 微毒

有效成分及其含量： 中生菌素 6%


使用范围和使用方法：

作物/场所	防治对象	用药量（制剂量/亩）	施用方式
柑橘树	溃疡病	1500-2000 倍液	喷雾
水稻	白叶枯病	30-40 毫升/亩	喷雾
马铃薯	黑胫病	30-50 毫升/亩	喷雾
黄瓜	细菌性角斑病	30-50 毫升/亩	喷雾

使用技术要求：

1. 防治水稻白叶枯病时，于发病前或发病初期进行常规喷雾施药，可用药 2—3 次，间隔 7—10 天 1 次，用水量为 30—40 公斤/亩；防治柑橘树溃疡病时，于发病前或发病初期喷雾处理，可施药 2—3 次，每次施药间隔 7—10 天；防治黄瓜细菌性角斑病时，于发病前或发病初期兑水茎叶喷雾，施药 3 次，施药间隔为 7 天，用水量为 40—60 公斤/亩。马铃薯黑胫病发病前或发病初期兑水茎叶喷雾处理，每隔 7—10 天左右喷一次，可施药 3 次，兑水量 45—60 公斤/亩。2. 大风天或预计 1 小时之内有降雨，请勿使用。

产品介绍：细筒



农药登记证号：PD20211024

登记证持有人：福建凯立生物制品有限公司

农药名称：中生菌素

剂型：可溶粉剂

毒性及其标识：

有效成分及其含量：中生菌素 6%

使用范围和使用方法：

作物/场所	防治对象	用药量（制剂量/亩）	施用方式
三七	细菌性根腐病	65-75 克/亩	灌根
柑橘树	溃疡病	1500-2000 倍液	喷雾
黄瓜	细菌性角斑病	30-40 克/亩	喷雾

使用技术要求：

1. 黄瓜细菌性角斑病：于病害发生前或初期，喷雾施药 2—3 次，每隔 7—10 天施药 1 次，用水量 45—60 公斤/亩；2. 柑橘树溃疡病：于发病前或初期进行常规喷雾，可用药 3 次，间隔 10 天左右 1 次；3. 三七细菌性根腐病：于发病前或零星发病时进行灌根，视发病情况可施药 2—3 次，间隔 7—10 天 1 次，用水量 200—600 公斤/亩。4. 大风天或预计 1 小时内降雨，请勿施药。

产品介绍：欣露



农药登记证号：PD20190224

登记证持有人：福建凯立生物制品有限公司

农药名称：中生菌素

剂型：可溶液剂

毒性及其标识：

有效成分及其含量：中生菌素 3%

使用范围和使用方法：

作物/场所	防治对象	用药量（制剂量/亩）	施用方式
库尔勒香梨树	火疫病	600-700 倍液	喷雾
柑橘树	溃疡病	600-800 倍液	喷雾
水稻	白叶枯病	60-80 毫升/亩	喷雾
黄瓜	细菌性角斑病	80-110 毫升/亩	喷雾

使用技术要求：

1. 于水稻白叶枯病发生前或发病初期施药，可施药 2 次，间隔 7 天左右。兑水量 40—50 公斤/亩。于柑橘溃疡病发病前或发病初期喷雾处理，可施药 3 次，每次施药间隔 7—10 天；于黄瓜细菌性角斑病发病前或发病初期兑水茎叶喷雾，间隔 7—10 天喷药 1 次，用水量为 50—60 公斤/亩；于库尔勒香梨树火疫病发病初期兑水茎叶喷雾 1 次，之后视病情发展情况间隔 7—10 天再喷 1 次，可连续用药 2 次。2. 在黄瓜上安全间隔期为 3 天，每季最多使用 3 次。3. 大风天或预计 1 小时之内有降雨，请勿使用。

产品介绍：满康



农药登记证号：PD20170764

登记证持有人：福建凯立生物制品有限公司

农药名称：中生菌素

剂型：可湿性粉剂

毒性及其标识：

有效成分及其含量：中生菌素 5%

使用范围和使用方法：

作物/场所	防治对象	用药量（制剂量/亩）	施用方式
库尔勒香梨树	火疫病	800-1000 倍液	喷雾
猕猴桃	溃疡病	1000-1300 倍液	喷雾
黄瓜	细菌性角斑病	50-70 克/亩	喷雾

使用技术要求：

1. 采用二次稀释法兑水配药。于黄瓜细菌性角斑病发病前或发病初期均匀喷雾，间隔 7—10 天喷药 1 次，用水量 45—60 公斤/亩；于库尔勒香梨树火疫病发病初期用药 1 次，之后视病情发展情况间隔 7—10 天再喷 1 次，可连续用药 2 次；猕猴桃溃疡病在入冬前第 1 次施药，立春后至萌芽前第 2 次施药，间隔 10 天第 3 次施药。2. 黄瓜安全间隔期为 5 天，每季最多使用 3 次。3. 大风天或预计 1 小时内降雨，请勿施药。4. 在推广使用前，不同品种的猕猴桃须先进行小范围不同浓度药剂处理的作物安全性验证试验。

产品介绍： 中生



农药登记证号：PD20110113

登记证持有人：福建凯立生物制品有限公司

农药名称：中生菌素

剂型：可湿性粉剂

毒性及其标识：

有效成分及其含量：中生菌素 3%

使用范围和使用方法：

作物/场所	防治对象	用药量（制剂量/亩）	施用方式
猕猴桃	溃疡病	600-800 倍液	喷雾
苹果树	轮纹病	800-1000 倍液	喷雾
黄瓜	细菌性角斑病	80-110 克/亩	喷雾

使用技术要求：

1. 在病害发生前期或初期按上述施用方法进行防治。
2. 宜于早上及傍晚用药，每隔 7—10 天施药 1 次，连续 3 次；猕猴桃溃疡病在入冬前第 1 次施药，立春后至萌芽前第 2 次施药，间隔 10 天第 3 次施药。
3. 大风天或预计 1 小时内降雨，请勿施药。
4. 黄瓜上安全间隔期 3 天，每季最多使用 3 次，用水量 45—60 公斤/亩；苹果树应至少间隔 7 天收获，每季最多使用 3 次。

产品介绍： 秣糠



农药登记证号：PD20181745
登记证持有人：福建凯立生物制品有限公司
农药名称：中生素
剂型：颗粒剂
毒性及其标识：**微毒**
有效成分及其含量：中生菌素 0.5%
使用范围和使用方法：

作物/场所	防治对象	用药量（制剂量/亩）	施用方式
番茄	青枯病	2500-3000 克/亩	穴施

使用技术要求：
于移栽时均匀穴施，施药一次。